

# ANEXO II (CAPÍTULO 10). FÁRMACOS ADMINISTRADOS POR SONDA

M. Cameán-Fernández

Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
811869	ABACAVIR	ZIAGEN 300 MG COMP; SOLUCIÓN	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua. No emplear la solución por su alto contenido en sorbitol (70%)
605873	ACENOCUMAROL	SINTROM 4 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. Controlar tiempo de coagulación
749267	ACETAZOLAMIDA	EDEMOX 250 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua. El Servicio de Farmacia dispone de fórmula magistral extemporánea
848531	ACETILCISTEINA	FLUMIL 200 MG SOBRES	SI	Diluir con 50 ml agua y administrar inmediatamente.
601104	ACETILSALICILATO DE LISINA	INYESPRIN SOBRES	SI	Diluir con 20 ml de agua y administrar inmediatamente
638882	ACETILSALICILICO ACIDO	ASPIRINA 500 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
624833	ACETILSALICILICO ACIDO	ADIRO 100 MG COMP	NO	No triturar. Emplear inyesprim sobres: diluir con 20 ml de agua y administrar inmediatamente
601872	ACICLOVIR	ACICLOVIR 800 MG COMP	SI	Triturar, dispersar con 30 ml de agua y administrar.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>884304</b>	ACICLOVIR	ZOVIRAX FORTE SUSP 100ML	NO	Puede producir problemas por su alta osmolalidad y su alto contenido en sorbitol.
<b>779801</b>	ADEFOVIR DIPOVOXILO	HEPSERA 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar con 20 ml de agua.
<b>690792</b>	ALBENDAZOL	ESKAZOLE 400 MG COMP	NO	El fabricante no recomienda triturar los comprimidos recubiertos.
<b>647933</b>	ALMAGATO	ALMAX FORTE 1,5 G SOBRE	SI	Diluir en 25 ml de agua y administrar inmediatamente. Detener la NE 1h antes o 1 h después.
<b>960930</b>	ALOPURINOL	ZYLORIC 100, 300 MG COMP	SI	Triturar y dispersar con 10 ml de agua, administrar inmediatamente.
<b>885178</b>	ALPRAZOLAM	TRANKIMAZIN 0,25, 1 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en agua, y administrar inmediatamente.
<b>2222</b>	ALUMINIO HIDROXIDO	ALUGEL 350 MG/5ML SUSP	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente. Detener la NE 1h antes o 2 h después.
<b>704510</b>	AMANTADINA	AMANTADINE 100 MG CAPS E/20	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 10 ml de agua.
<b>999999</b>	AMBROXOL	AMBROXOL RATIOPHARM 15 mg/5ml 200 ml	SI	Considerar que contiene sorbitol.
<b>100229</b>	AMILORIDA	MODAMIDE 5 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>704783</b>	AMILORIDA, HIDROCLOROTIAZIDA	AMERIDE 5/50 MG COMP E/60	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>617506</b>	AMIODARONA	TRANGOREX 200 MG COMP	SI	Triturar, dispersar en 20 ml de agua y administrar inmediatamente.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>624015</b>	AMITRIPTILINA	TRYPTIZOL 25, 50, 75 MG COMP	SI	Triturar, dispersar en 10 ml de agua, administrar inmediatamente.
<b>642504</b>	AMLODIPINO	ASTUDAL 5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>603472</b>	AMOXICILINA	AMOXICILINA 500 MG CAPS	SI	Abrir y dispersar en 10 ml de agua.
<b>607069</b>	AMOXICILINA	AMOXI GOBENS 250 MG SOBR	SI	Diluir con 20 ml de agua y administrar.
<b>636472</b>	AMOXICILINA CLAVULANICO	AUGMENTINE 500, 875 MG SOBRES	SI	Diluir con 20 ml y administrar.
<b>636498</b>	AMOXICILINA CLAVULANICO	AUGMENTINE 500 MG COMP	Si	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>0</b>	COTRIMOXAZOL	SEPRIM FORTE COMP, SUSP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. La suspensión diluirla en 50 ml de agua.
<b>660787</b>	AMPRENAVIR	AGENERASE 150 MG CAPS	NO	Emplear la solución diluyéndola previamente con 50 ml de agua.
<b>100066</b>	ANAGRELIDA	AGRYLIN 0,5 MG CAPS	NO	Buscar vía o fármaco alternativo.
<b>862847</b>	ATAZANAVIR	REYATAZ 200 MG CAPS E/60	SI	Abrir y dispersar en 10 ml de agua
<b>615245</b>	ATENOLOL	TENORMIN 50, 100 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>851154</b>	ATORVASTATINA	PREVENCOR 80 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>933176</b>	AZATIOPRINA	IMUREL 50 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>649327</b>	AZITROMICINA	ZITROMAX 500 MG COMP E/150	SI	Emplear sobres disolviendo el contenido con 20 ml de agua.
<b>780627</b>	BACLOFENO	LIORESAL 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>944702</b>	BETAHISTINA	SERC 8 MG COMP E/60	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>859892</b>	BIPERIDENO	AKINETON 2 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>859900</b>	BIPERIDENO	AKINETON 4 MG RETARD GG	NO	No triturar, recurrir a comp de liberación rápida.
<b>647438</b>	BISOPROLOL	EMCONCOR 5, 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>759936</b>	BOSENTAN	TRACLEER 125 MG COMP	NO	NO existe experiencia. En principio no hay problema pero se aconseja no administrar por esta vía por falta de datos.
<b>779553</b>	BROMAZEPAN	LEXATIN 1,5 MG CAPS E/30	SI	Abrir la cápsula, dispersar el contenido en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>958728</b>	BROMOCRIPTINA	PARLODEL 2,5; 5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>723213</b>	BUSULFAN	BUSULFAN 2 MG COMP E/100	SI	Desleir en agua siguiendo precauciones para fármacos citostáticos.
<b>683052</b>	CABERGOLINA	DOSTINEX 0,5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>651703</b>	CALCIO LACTATOGLUCONATO/CARBONATO	CALCIUM FORTE COMP	SI	Disolver en 20 ml de agua y administrar sin gas.
<b>955526</b>	CALCITRIOL	ROCAITROL 0,25 MCG CAPS	NO	Cápsulas con contenido oleoso que podría adherirse a la pared de la sonda. Administrar vía parenteral.
<b>630970</b>	CAPTOPRILLO	CAPOTEN 12,5, 25, 50 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>605881</b>	CARBAMAZEPINA	TEGRETOL 200, 400 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de solución hidroalcohólica.
<b>792499</b>	CARBIMAZOL	NEO TOMIZOL 5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>644633</b>	CARVEDILOL	COROPRES 6,25, 25 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>627075</b>	CEFADROXILO	DURACEF 500 MG CAPS E/500	SI	Abrir la cápsula, dispersar el contenido en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>638551</b>	CEFUROXIMA AXETILO	ZINNAT 500 MG COMP E/500	NO	La trituración no asegura la biodisponibilidad. Recurrir a ff alternativas: sobres, susp.
<b>762955</b>	CICLOFOSFAMIDA	GENOXAL 50 MG GRAGEAS E/20	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente. Seguir consejos manipulación de citostáticos.
<b>999919</b>	CICLOSERINA	CYCLOSERINA 250 MG CAP E/100	SI	Abrir la cápsula, dispersar el contenido en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>650093</b>	CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEOR 25,50, 100 MG CAPS	NO	Emplear la solución comercial: disolver en 50 ml de agua, zumo o leche en vaso de vidrio. Monitorizar niveles.
<b>604520</b>	CIPROFLOXACINA	CIPROFLOXACINO 250, 500, 750 MG COMP	SI	Detener la NE 1 h antes ó 2 h después. Triturar y dispersar en 10 ml agua y administrar inmediatamente.
<b>614826</b>	CLARITROMICINA	CLARITROMICINA 250, 500mg ORAL NORMON	NO	Recurrir a sobres disolviéndolos en 20 ml de agua.
<b>608570</b>	CLINDAMICINA	DALACIN 150, 300 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, dispersar en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>798215</b>	CLOMETIAZOL	DISTRANEURINE 192 MG CAPS	NO	Por su elevada viscosidad se adhiere a la sonda.
<b>637017</b>	CLOMIPRAMINA	ANAFRANIL 25, 50, 75 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>819029</b>	CLONAZEPAM	RIVOTRIL 2 MG COMP E/60	NO	Emplear las gotas disolviendolas en 10 ml de agua.
<b>726224</b>	CLONIDINA	CATAPRESAN 0,15 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>669887</b>	CLOPERASTINA	FLUTOX 200 ML JARABE E/1	SI	Diluir en 20 ml de agua.
<b>656553</b>	CLOPIDOGREL	PLAVIX 75 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>779470</b>	CLORAMBUCIL	LEUKERAN 2 MG COMP	NO	Emplear suspensión.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>617407</b>	CLORAZEPATO	TRANXILIMUM 5, 10, 15, 50 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, dispersar en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>777789</b>	CLORPROMAZINA	LARGACTIL 25 MG COMP	NO	Emplear la presentación en gotas, administrándolas directamente.
<b>769562</b>	CLORTALIDONA	HIGROTONA 50 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>754143</b>	CLOTIAPINA	ETUMINA 40 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>636399</b>	CLOXACILINA	ORBENIN 500 MG CAPS	SI	Preferible emplear la presentación de jarabe que se puede administrar directamente. Las cápsulas se abren y se dispersan en 10 ml de agua.
<b>672360</b>	CLOZAPINA	LEPONEX 100 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>796052</b>	CODEINA	CODEISAN 30 MG COMP	SI	Preferible emplear jarabe. Se puede triturar el comprimido y dispersarlo en 10 ml de agua.
<b>881730</b>	COLCHICINA	COLCHICINE HOUDE GRÁNULOS	SI	No triturar los gránulos: pa muy irritante. Disgregar en agua y administrar inmediatamente.
<b>725994</b>	COLECALCIFEROL	VITAMINA D3 2 MUI GOTAS	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente.
<b>824284</b>	COLESTIRAMINA	RESINCOLESTIRAMINA 4 G SOBRES	SI	Diluir con 150 ml de agua o zumo y dejar reposar unos minutos. Administrar separadamente de los medicamentos porque puede interferir en la absorción de los mismos.
<b>682914</b>	DANAZOL	DANATROL 200 MG CAPS E/60	SI	Abrir la cápsula, dispersar en 10 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>640243</b>	DEFLAZACORT	ZAMENE 6, 30 MG COMP	NO	Preferible emplear gotas comerciales, disolviéndolas en 10 ml de agua.
<b>615328</b>	DEXAMETASONA	FORTECORTIN 1 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. Se puede preparar un jarabe como FM en farmacia.
<b>809459</b>	DEXCLORFENIRAMINA	POLARAMINE 2 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. El jarabe se puede administrar directamente si se emplea sonda NG. El jarabe contiene sorbitol.
<b>788489</b>	DEXCLORFENIRAMINA	POLARAMINE 6 MG REPETABS	NO	Emplear comp de liberación rápida o la suspensión comercial.
<b>819581</b>	DEXTROMETORFANO	ROMILAR 15 MG COMP	NO	Emplear las gotas diluidas en agua. El jarabe debe diluirse en 25 ml de agua.
<b>626374</b>	DIAZEPAM	DIAZEPAM 5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>100182</b>	DIAZOXIDO	PROGLICEM 25 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, dispersar y administrar inmediatamente.
<b>636985</b>	DICLOFENACO	DICLOFENACO 50 MG COMP	NO	No triturar porque tiene cubierta entérica. Alternativa: cambiar a otro AINE.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>901140</b>	DIDANOSINA	VIDEX 200, 250, 400 MG CAPS	NO	No utilizar la cápsula por ser gastroresistente. Emplear los comprimidos dispersables o mastigables: 2 comp en 50 ml de agua.
<b>610212</b>	DIGOXINA	DIGOXINA 0,25 mg COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. Se puede preparar un jarabe como FM en farmacia.
<b>864975</b>	DILTIAZEM	MASDIL RETARD COMP 120 mg	NO	No triturar. Alternativa: comp de liberación rápida o susp comp FM.
<b>608000</b>	DILTIAZEM	MASDIL 60 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. Se puede preparar un jarabe como FM en farmacia.
<b>701979</b>	DIMETICONA	AERO RED 40 MG COMP	NO	Emplear gotas diluidas.
<b>969196</b>	DIPIRIDAMOL	PERSANTIN 100 MG GG	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>946590</b>	DOMPERIDONA	MOTILIUM 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>621904</b>	DOXAZOSINA	CARDURAN NEO 4 MG COMP	NO	No triturar los comprimidos retardados. Emplear por comprimidos de liberación rápida.
<b>626275</b>	DOXICICLINA	VIBRACINA 100 MG CAPS	SI	Abrir y dispersar en 10 ml de agua. La suspensión se puede administrar directamente si la sonda se localiza en el estómago.
<b>826495</b>	EFAVIRENZ	SUSTIVA 600 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, y dispersar con 20 ml de agua. Los alimentos grasos aumentan su absorción en un 50%.
<b>781757</b>	EMTRICITABINA	EMTRIVA 200 MG CAPSULAS E/30	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua.
<b>650921</b>	EMTRICITABINA + TENOFOVIR	TRUVADA 200+300 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>637603</b>	ENALAPRILLO	RENITEC 5, 20 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>600205</b>	ERITROMICINA	PANTOMICINA 500 MG COMP	NO	No triturar. Alternativa: sobres diluyendolo con 50 ml de agua.
<b>606715</b>	ESPIRONOLACTONA	ALDACTONE 25, 100 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>648154</b>	ESTAVUDINA	ZERIT 20, 40 MG CAPS	SI	Preferible emplear la solución comercial que se puede administrar directamente.
<b>790493</b>	ETAMBUTOL	MYAMBUTOL 400 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>0</b>	GABAPENTINA	GABAPENTINA 300, 400 MG COMP	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua.
<b>962712</b>	ETOPOSIDO	VEPESID 50 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar inmediatamente. Seguir recomendaciones de manipulación de citostáticos.
<b>646315</b>	FAMCICLOVIR	FAMVIR 250 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>750976</b>	FENITOINA	EPANUTIN 100 MG COMP, CAPS	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. Preferible emplear comprimidos por obtenerse niveles plasmáticos más altos que con las cápsulas. Administrar separadamente de la NE, una hora antes o dos horas después.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>793604</b>	FENOBARBITAL	LUMINAL 0,1 G COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>100012</b>	FENOXIBENZAMIDA	DIBENYLIN 10 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>748772</b>	FINASTERIDA	PROSCAR 5 MG COMP E/28	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>859991</b>	FLECAINIDA	APOCARD 100 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>610980</b>	FLUCONAZOL	FLUCONAZOL 100 mg CAPS	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua y administrar inmediatamente. La suspensión se podría administrar directamente si la sonda tiene localización gástrica.
<b>712919</b>	FLUDROCORTISONA	ASTONIN 0,1 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>945667</b>	FLUNARIZINA	SIBELIUM 5 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>675694</b>	FLUNITRAZEPAM	ROHIPNOL 1 MG COMP E/20	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>610626</b>	FLUOXETINA	PROZAC 20 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>971994</b>	FLUTAMIDA	EULEXIN 250 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>939579</b>	FOLICO ACIDO	ACFOL 5 MG COMP E/28	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>963470</b>	FOLINATO CALCICO	LEDERFOLIN 15 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>819474</b>	FOSAMPRENAVIR	TELZIR 700 MG CAPS E/60	SI	Triturar y dispersar en 30 ml de agua.
<b>604728</b>	FOSFOMICINA	FOSFOCINA 500 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>691220</b>	FUROSEMIDA	SEGURIL 40 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>640961</b>	GEMFIBROZIL	LOPID 600 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>739888</b>	GLIBENCLAMIDA	DAONIL 5 MG TABL	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>681338</b>	GLICLAZIDA	DIAMICRON 80 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>788877</b>	GLIPIZIDA	MINODIAB 5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>694554</b>	GRANISETRON	KYTRIL 1 MG COMP E/10	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>989475</b>	HALOPERIDOL	HALOPERIDOL 10 MG COMP	NO	Preferentemente emplear las gotas comerciales 2 mg/ml.
<b>650283</b>	HALOPERIDOL	HALOPERIDOL 2 MG/ML GTS	SI	Diluir en 10 ml de agua y administrar inmediatamente. Administrar 1 h antes ó 2 h después de la NE. pH.
<b>955401</b>	HIDRALAZINA	HYDRAPRES 25 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>804328</b>	HIDROCLOROTIAZIDA	ESIDREX 25 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>770073</b>	HIDROCORTISONA	HIDROALTESONA 20 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>669473</b>	HIDROXIUREA	HYDREA 500 MG CAPS	SI	Desleir en agua y administrar inmediatamente.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>713032</b>	HIDROXIZINA	ATARAX 25 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>756965</b>	HIERRO (II) SULFATO	FERO GRADUMET 525MG COMP	NO	Emplear ampollas bebibles.
<b>878405</b>	IBUPROFENO	DALSY 200 MG SOBRES E/20	SI	Preferentemente si tiene localización intestinal, diluyendo el sobre en 50 ml de agua.
<b>631051</b>	IBUPROFENO	IBUPROFENO 600 MG COMP E/500	NO	Emplear suspensión (gástrica) o sobres (intestinal).
<b>666107</b>	IBUPROFENO	DALSY 100 mg/5 ml 200 ml SUSP E/1	SI	Administrar directamente si la sonda tiene localización gástrica, si no fuera así emplear los sobres disueltos en agua.
<b>991224</b>	IMIPRAMINA	TOFRANIL PAMOATO 75MG CAP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>625376</b>	INDAPAMIDA	TERTENSIF RETARD 1,5 mg COMP	NO	Emplear otro diurético.
<b>674499</b>	INDINAVIR	CRIVAN 200, 400 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar inmediatamente.
<b>623892</b>	INDOMETACINA	INACID 25 MG CAPS E/500	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua.
<b>778670</b>	ISONIAZIDA/PIRIDOXINA	CEMIDON 150 B6 COMP E/50	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>638775</b>	ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA / RIFAMPICINA	RIFATER 50/300/120 MG E/500	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>620344</b>	ISONIAZIDA / RIFAMPICINA	RIFINAH 300 MG COMP E/500	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>617738</b>	ISOSORBIDA DINITRATO	ISOLACER RETARD 20 MG	NO	No triturar. Emplear comprimidos de liberación rápida.
<b>617761</b>	ISOSORBIDA MONONITRATO	UNIKET 20 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>645390</b>	ITRACONAZOL	SPORANOX 100 MG CAPS	NO	Emplear suspensión comercial 10 mg/ml para las sondas gástricas. Su absorción se favorece en medio ácido por lo que no se deben utilizar fármacos que disminuyan la secreción, o al menos, espaciar la administración de ambos.
<b>641134</b>	KETOCONAZOL	MICOTICUM 200 MG COMP	NO	Preferentemente emplear la suspensión comercial. Su absorción se favorece en medio ácido por lo que no se deben utilizar fármacos que disminuyan la secreción, o al menos, espaciar la administración de ambos.
<b>641456</b>	KETOROLACO	TORADOL 10 MG COMP E	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>838227</b>	LABETALOL	TRANDATE 100 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>784538</b>	LACTITOL	EMPORTAL SOBRES 10 g	SI	Disolver en 25 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>694760</b>	LACTULOSA	DUPHALAC 10 g/15 ml SOBRES, Solucion	SI	Disolver en 25 ml de agua y administrar inmediatamente.



Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>707562</b>	LAMIVUDINA	EPIVIR 300 MG COMP	SI	Emplear la solución comercial directamente para localización gástrica. Los comp deben triturarse y dispersar en 20 ml de agua.
<b>611065</b>	LAMOTRIGINA	LAMOTRIGINA 50 mg COMP DISP E/56	SI	Dispersar en 10 ml de agua.
<b>100703</b>	LEVAMISOL	ERGAMISOL 50 MG COMP E/36	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente.
<b>669770</b>	LEVODOPA/BENSERAZIDA	MADOPAR 200/50 MG COMP E/100	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. No administrar conjuntamente con dietas hiperprotéicas.
<b>824185</b>	LEVODOPA CARBIDOPA	SINEMET 250/25 MG /PLUS 200/50 COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua. No administrar conjuntamente con dietas hiperprotéicas.
<b>908897</b>	LEVODOPA CARBIDOPA	SINEMET RETARD 200/50 RT 25/100 MG	NO	Adaptar dosis de Sinemet.
<b>602862</b>	LEVOFLOXACINO	TAVANIC 500 MG COMP	SI	Triturar, disgregar en 10 ml de agua. Se recomienda emplear Ofloxacina por ser la quinolona con mejor biodisponibilidad.
<b>619924</b>	LEVOMEPROMAZINA	SINOGAN 25, 100 MG COMP	NO	Emplear gotas 40 mg/ml.
<b>960351</b>	LEVOTIROXINA	LEVOTHROID 50, 100 MCG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>904227</b>	LINEZOLID	ZYVOXID 600 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>990770</b>	LISURIDA	DOPERGIN 0.2 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>728972</b>	LITIO CARBONATO	PLENUR 400 MG COMP	NO	NO triturar son de liberación sostenida.
<b>800417</b>	LOPERAMIDA	FORTASEC 2 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua.
<b>906974</b>	LOPINAVIR + RITONAVIR	KALETRA 133/33 MG CAPS	NO	Emplear la solución comercial 400-100/5ml.
<b>906990</b>	LOPINAVIR + RITONAVIR	KALETRA 60 ML SOL E/5	SI	Administrar directamente si localización gástrica. Si la sonda fuera intestinal diluir previamente con 20 ml de agua.
<b>992594</b>	LORATADINA	CIVERAN 10 MG COMP E/20	SI	Triturar en bolsa de plástico. Manejar como citostático.
<b>625459</b>	LORAZEPAM	LORAZEPAM 1MG COMP NORMON	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>639369</b>	LORMETAZEPAM	NOCTAMID 1 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>647529</b>	LOSARTAN	COZAAR 12,5 ,50 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>803668</b>	MEBENDAZOL	LOMPER 100 MG COMP	NO	Emplear suspensión comercial 100 mg/5ml directamente.
<b>0</b>	METOCLOPRAMIDA	PRIMPERAN COMP	NO	Emplear el jarabe comercial 5mg/ 5ml diluyéndolo con 20 ml de agua.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>0</b>	NITROGLICERINA	CAFINITRINA gg	NO	Administrar vía sublingual.
<b>100132</b>	MEFLOQUINA	LARIAM 250 MG COMPRIMIDOS	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>661488</b>	MEGESTROL ACETATO	MEGEFREN 160 mg SOBRES	SI	Diluir en 25 ml de agua.
<b>941476</b>	MELFALAN	MELFALAN 2 MG COMP E/50	SI	Triturar en bolsa de plástico. Manejar como citostático.
<b>648535</b>	MELOXICAM	MOVALIS 7,5 MG COMP/500	NO	Valorar otro AINE como alternativa.
<b>917591</b>	MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA 50 MG COMP E/25	SI	Triturar en bolsa de plástico. Manejar como citostático. Administrar en ayunas para favorecer su absorción y con abundantes líquidos.
<b>984088</b>	MESALAZINA	CLAVERSAL 500 MG COMP	NO	No triturar, posee cubierta entérica. Alternativa sobres comerciales.
<b>200010</b>	METADONA	METADONA 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>604298</b>	METAMIZOL	NOLOTIL 575 MG CAPS	NO	Empear las ampollas diluidas en 20 ml de agua.
<b>652200</b>	METFORMINA	METFORMINA 850 mg COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>842500</b>	METIL-PREDNISOLONA	URBASON 4 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>703108</b>	METILDOPA	ALDOMET 250 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>787259</b>	METOTREXATO	METOTREXATO 2,5 MG COMP E/50	SI	Triturar en bolsa de plástico. Manejar como citostático. Administrar en ayunas para favorecer su absorción.
<b>758169</b>	METRONIDAZOL	FLAGYL 250 MG COMP	NO	Emplear la solución comercial 200 ml/5ml. Diluyéndola en agua si tiene localización intestinal.
<b>937029</b>	MEXILETINA	MEXITIL 200 MG CAPS	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua.
<b>896886</b>	MIANSERINA	LANTANON 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>679373</b>	MICOFENOLATO MOFETILO	CELLCEPT 500 MG COMP	NO	No se puede triturar. Emplear la suspensión comercial directamente. Si tuviera localización intestinal diluir con 50 ml de agua.
<b>650887</b>	MIDAZOLAM	DORMICUM 7,5 MG COMP	NO	Emplear preferentemente la suspensión de FM.
<b>990317</b>	MISOPROSTOL	CYTOTEC 200 MCG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>968115</b>	MOLSIDOMINA	MOLSIDAIN 2, 4 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>647834</b>	MORFINA	MST 10, 30, 60, 100 MG CONTINUOUS COMP	NO	No triturar, emplear comprimidos de liberación rápida.
<b>649848</b>	NAPROXENO	NAPROXENO 500 MG COMP E/500	SI	Preferentemente emplear sobres diluyéndolos en 50 ml de agua.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>846899</b>	NELFINAVIR	VIRACEPT 250 MG COMP	SI	Preferentemente emplear la presentación de polvos diluyéndolos en agua.
<b>629089</b>	NEOMICINA	NEOMICINA 500 MG COMP E/500	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>661751</b>	NEVIRAPINA	VIRAMUNE 200 MG COMP	SI	Preferentemente emplear la presentación en suspensión diluyéndola con 20 ml de agua.
<b>603258</b>	NIFEDIPINO	ADALAT 10 MG CAPS	NO	Emplear vía sublingual.
<b>641829</b>	NIMODIPINO	BRAINAL 30 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1).
<b>790550</b>	NISTATINA	MYCOSTATIN GRAGEAS	NO	Emplear la suspensión comercial diluida en 20 ml (gástrica) ó 50 ml si intestinal.
<b>631705</b>	NITROFURANTOINA	FURANTOINA 50MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>624064</b>	NORFLOXACINA	NOROXIN 400 MG COMP	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente. La quinolona que presenta mejor biodisponibilidad es Ofloxacin dispersada en 10 ml de agua.
<b>674572</b>	OLANZAPINA	ZYPREXA 10 MG COMP	NO	Emplear comprimidos sublinguales.
<b>889907</b>	OLANZAPINA	ZYPREXA VELOTAB 10MG COMP	NO	Administrar vía sublingual.
<b>916585</b>	OTILONIO	SPASMOCTYL 40 MG GRAGEAS	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>918003</b>	PANCREATINA	KREON 10.000 CAPS	SI	No triturar. Abrir la cápsula, dispersar en agua y administrar inmediatamente.
<b>629501</b>	PARACETAMOL	TERMALGIN COMP 500 mg	SI	Preferentemente emplear la solución comercial directamente o diluyéndola con 30 ml de agua si su localización es intestinal.
<b>770917</b>	PAROMOMICINA	HUMATIN 250 MG CAPS E/8	NO	Emplear la solución comercial diluida con 20 ml de agua.
<b>644948</b>	PAROXETINA	SEROXAT 20 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>824318</b>	PENICILAMINA	CUPRIPEN 50 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>638957</b>	PENTOXIFILINA	ELORGAN 400 MG COMP	NO	No triturar. Comprimidos entéricos. Emplear ampollas comerciales directamente.
<b>668525</b>	PERGOLIDA	PHARKEN 1 MG GG E/30	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
<b>791681</b>	PERICIAZINA	NEMACTIL 50 MG COMP E/30	NO	Emplear las gotas comerciales admistradas directamente.
<b>626689</b>	PIPEMIDICO ACIDO	NURIL 400 MG CAPS	SI	Abrir la capsula y dispersar en 20 ml de agua y administrar inmediatamente.
<b>894485</b>	PIRAZINAMIDA	PIRAZINAMIDA 250 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua.
<b>0</b>	POTASIO GLUCOHEPTONATO	Solucion		Diluir y administrar inmediatamente. No administrar con la NE riesgo de precipitación de la NE.

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
851089	PIRIDOSTIGMINA	MESTINON 60 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
715763	PIRIDOXINA	BENADON 300 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
739961	PIRIMETAMINA	DARAPRIM 25 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
644443	POTASIO GLUCOHEPTONATO	POTASION 600 MG CAPS	NO	Emplear solución comercial diluida.
617878	PREDNISONA	PREDNISONA 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
718361	PROCAINAMIDA	BIOCORYL 250 MG CAPS	SI	Abrir la capsula y dispersar en 20 ml de agua
791285	PROCARBAZINA	NATULAN 50 MG CAPS	SI	Manejar como citostático.
949347	PROPAFENONA	RYTMONORM 150 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
100187	PROPILTIOURACILO	PROPYCIL 100 MG TABLETA	SI	Triturar y dispersar en agua
615211	PROPRANOLOL	SUMIAL 10 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
713115	QUETIAPINA	SEROQUEL 300 MG COMP E/60	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
643304	RAMIPRILO	ACOVIL 2,5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
692681	RANITIDINA	ALQUEN 150 MG COMP EFERV	SI	No triturar. Disolver en 20 ml de agua y desgasificar
648253	RANITIDINA	ZANTAC 300 MG COMP	SI	Preferentemente emplear comprimidos efervescentes
717702	REPAGLINIDA	NOVONORM 0,5 MG COMP	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua.
787382	RETINOL	AUXINA A MASIVA CAPS	NO	Emplear gotas comerciales.
883108	RIBAVIRINA	RIBAVIRINA 250 MG, 300 MG CAPS	SI	Abrir la capsula y disgregar en 20 ml de agua
694216	RIFABUTINA	ANSATIPIN 150 MG CAPS E/30	SI	Abrir la capsula y disgregar en 20 ml de agua
817866	RIFAMPICINA	RIFALDIN 100 MG/5 ML SOL E/1	SI	Administrar directamente
620294	RIFAMPICINA	RIFALDIN 600 MG GG	NO	Emplear suspensión comercial 100 mg/5ml
676262	RILUZOL	RILUTEK 50 MG COMP E/56	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
659813	RISPERIDONA	RISPERDAL 1MG/ML 100ML SOL E/1	SI	Administrar directamente
651193	RISPERIDONA	RISPERIDONA 1 mg COMP E/60	NO	Emplear la solución comercial 1mg/ ml
809327	RITODRINA	PRE PAR 10 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
849414	RITONAVIR	NORVIR 100 MG CAPS E/336	NO	Emplear la solución comercial 80 mg/ml directamente si la sonda tiene localización gástrica. Si el extremo distal se alojara en el intestino utilizar las cápsulas, extrayendo el contenido y diluyéndolo con 10 ml de mezcla hidroalcohólica

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>845735</b>	SALBUTAMOL	VENTOLIN 4 MG COMP E/30	NO	Emplear la solución comercial 2mg/5ml diluida
<b>845719</b>	SALBUTAMOL	VENTOLIN 2 MG/5 ML SOL E/1	SI	Diluir y administrar inmediatamente
<b>651457</b>	SAQUINAVIR	INVIRASE 500 mg CAPS E/120	SI	Abrir la cápsula y idispersar con con 10 ml de agua
<b>640706</b>	SIMVASTATINA	SIMVASTATINA 20 MG COMP	SI	Manipular como citostático
<b>976225</b>	SUCRALFATO	URBAL 1 G SOBRES E/50	NO	No se recomienda por la posibilidad de formar bezoares
<b>607341</b>	SULFADIAZINA	SULFADIAZINA 500 MG COMP E/500	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>100167</b>	SULFADOXINA + PIRIMETAMINA	FANSIDAR 500 MG COMP E/9	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
<b>725523</b>	SULPIRIDE	DOGMATIL 50 MG CAP E/30	NO	Preferentemente emplear la solución diluyéndola en 50 ml de agua
<b>984070</b>	TAMOXIFENO	TAMOXIFENO 10 MG COMP E/100	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>938662</b>	TEGAFUR	UTEFOS 400 MG CAPS E/20	SI	Manipular como citostático
<b>770396</b>	TEGAFUR URACILO	UFT 100 MG GRANULADO SOBR E/60	SI	Manipular como citostático
<b>658393</b>	TEMOZOLOMIDA	TEMODAL 20 MG CAPS E/20	SI	Manipular como citostático. Dispersar el contenido de cápsula con 20 ml de solución extemporánea de pH ácido
<b>818435</b>	TENOFOVIR	VIREAD 245 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>967976</b>	TEOFILINA	VENT RETARD 100 MG CAPS E/40	NO	Emplear la solución comercial diluyéndola con 20 ml de agua si localización intestinal
<b>665612</b>	TETRAZEPAN	MYOLASTAN 50 MG COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>715961</b>	TIAMINA	BENERVA 300 MG COMP E/20	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>835843</b>	TIAPRIDA	TIAPRIZAL 100 MG COMP E/24	NO	Preferentemente emplear las gotas comerciales que se pueden administrar directamente
<b>617464</b>	TICLOPIDINA	TIKLID 250 MG GRAGEAS E/500	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>837377</b>	TIETILPERAZINA	TORECAN 6,5 MG GRAGEAS E/20	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
836106	TIOGUANINA	TIOGUANINA 40 MG COMP E/25	SI	Triturar en bolsa de plástico. Manipular como citostático

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>629444</b>	TIORIDAZINA	MELERIL 50 MG GRAGEAS E/500	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
<b>646349</b>	TORASEMIDA	SUTRIL 5 mg COMP E/500	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>642751</b>	TRAMADOL	ADOLONTA 50 MG CAPS E/500	NO	Preferentemente emplear la solución comercial que se puede administrar directamente
<b>634303</b>	TRIFLUOPERAZINA	ESKAZINE 5 MG COMP E/500	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>631739</b>	TRIFLUSAL	DISGREN 300 MG CAPS E/500	SI	Abrir la cápsula y dispersar en 20 ml de agua
<b>711457</b>	TRIHEXIFENIDILO	ARTANE 2 MG COMP E/25	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>640870</b>	TRIMETAZIDINA	IDAPTAN 20 MG COMP E/500	NO	Emplear la solución comercial diluida en 30 ml de agua
<b>957639</b>	URSODEOXICOLICO ACIDO	URSOCHOL 150 MG COMP E/60	SI	Triturar el comprimido y dispersar en 20 ml de agua
<b>617480</b>	VALPROICO ACIDO	DEPAKINE 500 MG GRAGEAS E/500	NO	Emplear la solución comercial 200 mg/ml directamente
<b>741595</b>	VALPROMIDA	DEPAMIDE 300 MG GRAGEAS E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>686394</b>	VENLAFAXINA	DOBUPAL 75 MG COMP E/60	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>783415</b>	VERAPAMILO	MANIDON 80 MG GRAGEAS E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>913434</b>	VIGABATRINA	SABRILEX 500 MG COMP E/100	NO	Emplear los sobres comerciales disolviéndolos en 20 ml de agua
<b>665190</b>	VITAMINAS B12-B6-B1	HIDROXIL B12 B6 B1 COMP E/30	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>881532</b>	VORICONAZOL	VFEND 200 MG COMP E/14	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>712273</b>	WARFARINA	ALDOCUMAR 10 MG COMP E/40	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>693630</b>	ZALCITABINA	HIVID 0,75 MG COMP E/100	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua
<b>648709</b>	ZIDOVUDINA	ZIDOVUDINA 250 MG CAPS E/300	SI	Emplear la solución comercial diluida con 30 ml de agua para localización gástrica. Las cápsulas se pueden dispersar en 20 ml de agua
<b>668517</b>	ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA + ABACAVIR	TRIZIVIR COMP E/60	SI	Triturar y dispersar en 20 ml de agua

Código	Nombre	Denominación	SNG	Observaciones
<b>873992</b>	ZOLPIDEN	ZOLPIDEM 10 mg COMP REC E/30	SI	Triturar y dispersar en 10 ml de agua
<b>914648</b>	ZUCLOPENTIXOL	CISORDINOL 25 MG COMP E/30	NO	Preferentemente emplear las gotas comerciales diluidas en 10 ml de agua
<b>0</b>	HIERRO (II)	AMPOLLAS BEBIBLES	SI	Diluir su contenido y administrar. Interrumpir la NE 1h antes o dos horas después de su administración
<b>0</b>	TRANEXAMICO ACIDO 500 MG	AMCHAFIBRIN AMP	SI	Administrar la ampolla diluida con 20 ml de agua